

外来化学療法 投与計画書

腫瘍内科 ラムシルマブ+PAC療法

29-060

ID	:	身長	:	cm	パクリタキセル(壊死性) 80mg/m ² サイラムザ(起炎症性) 8mg/kg	
フリガナ	:	体重	:	kg		
患者氏名	:	体表面积	:	m ²		
	:	クレアチニン	:	mg/dL		
生年月日	:	M・T・S	年	月	日	生まれ
治療計画	外来初回治療日	平成 年 月 日より	コース目	day	開始	予定コース数 評価コース数
外来担当医:	PHS	記載医師	PHS	薬剤師1次監査	年 月 日	薬剤師 2次監査

Rp	投与スケジュール: 1コース28日間	day1	day8	day15	day22
	インラインフィルターのついたルートを使用				
1本目	末梢主管点滴注射 ポラミン(5) 5mg デカドロン(6.6) 6.6mg ファモチジン注(20) 20mg 生食 50mL 投与時間 30分	●	×	●	×
2本目	末梢主管点滴注射 生食 50mL 投与時間 全開	●	×	●	×
3本目	末梢主管点滴注射 サイラムザ _____ mg 生食 250mL 投与時間 60分 (_____ 年 _____ 月 _____ 日 %doseへ減量)	●	×	●	×
4本目	末梢主管点滴注射 生食 100mL 投与時間 60分 Infusion reactionの発現なければ3コース目以降全開投与	●	×	●	×
5本目	末梢主管点滴注射 パクリタキセル _____ mg 生食 250mL 投与時間 60分 (_____ 年 _____ 月 _____ 日 %doseへ減量)	●	×	●	×
6本目	末梢主管点滴注射 生食 50mL 投与時間 全開	●	×	●	×

	インラインフィルターのないルートを使用				
1本目	末梢主管点滴注射 ポラミン(5) 5mg デカドロン(6.6) 6.6mg ファモチジン注(20) 20mg 生食 50mL 投与時間 30分	×	●	×	×
2本目	末梢主管点滴注射 パクリタキセル _____ mg 生食 250mL 投与時間 60分 (_____ 年 _____ 月 _____ 日 %doseへ減量)	×	●	×	×
3本目	末梢主管点滴注射 生食 50mL 投与時間 全開	×	●	×	×

1. その他連絡事項

2017年4月 ガスター→ファモチジンへ変更
2016年11月 レイアウト変更
2016年6月 名称変更
2016年1月 ホラミン10mg→5mg
2015年8月28日作成