

外来化学療法 投与計画書

腫瘍内科 nabPAC+GEM療法

29-086

アブラキサン(壊死性) 125mg/m²
ゲムシタビン(炎症性) 1000mg/m²

ID	:	身長	:	cm		
フリガナ	:	体重	:	kg		
患者氏名	:	体表面積	:	m ²		
		クレアチニン	:	mg/dL		
生年月日	:	M・T・S	年	月	日	生まれ
治療計画	外来初回治療日	平成 年 月 日	より	コース目	day	開始
						予定コース数
						評価コース数
外来担当医:	PHS	記載医師	PHS	薬剤師1次監査	年	月
				Ⓢ	日	
						薬剤師2次監査
				Ⓢ		Ⓢ
Rp		投与スケジュール:1コース28日間	day1	day8	day15	day22
1本目	末梢主管点滴注射		●	●	●	×
	デカドロン(6.6)	6.6mg				
	アロキシ(0.75)	0.75mg				
	生食 100mL					
投与時間		30分				
2本目	末梢主管点滴注射		●	●	●	×
	アブラキサン _____mg					
	生食 _____mL (5mg/mLへ調製)					
投与時間		30分				
	(_____年 _____月 _____日 _____%doseへ減量)					
3本目	末梢主管点滴注射		●	●	●	×
	生食 50mL					
投与時間		全開				
4本目	末梢主管点滴注射		●	●	●	×
	ゲムシタビン _____mg					
	生食 100mL					
投与時間		30分				
	(_____年 _____月 _____日 _____%doseへ減量)					
5本目	末梢主管点滴注射		●	●	●	×
	生食 50mL					
投与時間		全開				

1. その他連絡事項

2016年11月 レイアウト変更
2016年6月 名称変更
2016年3月 ジェムザール→ゲムシタビン
2014年12月17日作成