

外来化学療法
投与計画書

腫瘍内科
G-CapeOX+ゾルベツキシマブ療法(初回・維持)

ID :		身長 :		cm	
フリガナ :		体重 :		kg	
患者氏名 :		体表面積 :		m ²	
		クレアチニン :		mg/dL	
生年月日 : S・H・R 年 月 日生まれ					
治療計画		外来初回治療日		予定コース数	
		年 月 日より		コース目 day 開始	
外来担当医:		PHS		記載医師 :	
		PHS		PHS	
Rp		投与スケジュール: 1コース21日間		day1 day8 day15	
		1本目と同時にカロナール500mg服用		●	
		インラインフィルターのついたルートを使用		●	
1本目		末梢主管点滴注射 デカドロン(6. 6) 6. 6mg パロノセトロン(0. 75) 0. 75mg ファモチジン(20) 20mg ポララミン(5) 5mg アロカリス(235) 235mg 生食 100mL		● × ×	
投与時間		30分			
2本目		末梢主管点滴注射 生食 100mL		● × ×	
投与時間		全開			
3本目		末梢主管点滴注射 初回800mg/m ² ビロイ mg 生食 1000mL 希釈濃度が2mg/mlになるように調整		● × ×	
投与時間		開始～30分 0 mL/hr (75mg/m ² /h) 30分～60分 0 mL/hr (100mg/m ² /h) 60分～90分 0 mL/hr (150mg/m ² /h) 90分以降 0 mL/hr (200mg/m ² /h) (年 月 日 %doseへ減量)		初回と維持(2回目以降)で用量や投与時間が異なるため注意してください。	
3本目		末梢主管点滴注射 維持600mg/m ² ビロイ mg 生食 500mL 希釈濃度が2mg/mlになるように調整		● × ×	
投与時間		開始～30分 0 mL/hr (100mg/m ² /h) 30分～60分 0 mL/hr (150mg/m ² /h) 60分～90分 0 mL/hr (200mg/m ² /h) 90分以降 0 mL/hr (300mg/m ² /h) (年 月 日 %doseへ減量)			
4本目		末梢主管点滴注射 生食 100mL		● × ×	
投与時間		30分			
5本目		末梢主管点滴注射 オキサリプラチン mg 5%ブドウ糖液 250mL 2時間 (年 月 日 %doseへ減量)		● × ×	
投与時間		全開			
6本目		末梢主管点滴注射 5%ブドウ糖液 50mL		● × ×	
投与時間		全開			
内服処方		ゼローダ mg 1日2回 朝夕食後 14日間		day1夕～day15朝 ×	

29-615A、29-615B

ビロイ(初回) 800mg/m²
ビロイ(維持) 600mg/m²
オキサリプラチン 130mg/m²
ゼローダ(内服)

薬剤師1次監査		年 月 日	
薬剤師2次監査			

腫瘍内科
G-CapeOX+ゾルベツキシマブ療法(初回・維持)

ゼローダの内服
day1夕食後からday15朝食後まで
(体表面積)

1.36㎡未満:	:2400mg/body/day
1.36㎡以上1.66㎡未満:	:3000mg/body/day
1.66㎡以上1.96㎡未満:	:3600mg/body/day
1.96㎡以上:	:4200mg/body/day

薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報提供)

☒ 依頼する ☐ 依頼しない

* 薬剤師が監査後【初回、維持】のピロイRpは必要の方を残し、残りは非表示にしてください。