

外来化学療法 投与計画書

呼吸器内科 CDDP+VNR療法【ショートハイドレーション】

59-007

ロゼウス(壊死性) 25mg/m²シスプラチン(炎症性) 80mg/m²

| | | | | | |
|---------|--|--|--------|----------------|-------|
| ID | : | 身長 | : | cm | |
| フリガナ | : | 体重 | : | kg | |
| 患者氏名 | : | 体表面积 | : | m ² | |
| | : | クレアチニン | : | mg/dL | |
| 生年月日 | : | M・T・S | : | 年 月 日 | 生まれ |
| 治療計画 | 外来初回治療日 | 予定コース数 | | | |
| | 平成 年 月 日より | コース目 day | 開始 | 評価コース数 | |
| 外来担当医 | PHS | 記載医師 | : | PHS | |
| 薬剤師1次監査 | | | | | 年 月 日 |
| 薬剤師2次監査 | | | | | |
| Rp | | 投与スケジュール: 1コース21日間 | day1 | day8 | day15 |
| 内服 | 入室時イメンド125mg 1カプセル服用 | | ● | × | × |
| | day2以降 イメンド80mg 1カプセル朝食後 2日分 | | day2-3 | × | × |
| | デカドロン(0.5) 1日8mg 食後 2日分 | | day2-3 | | |
| 1本目 | 末梢主管点滴注射 硫酸Mg補正液1mEq/mL 4mL L-アスパラギン酸K点滴静注液 10mL 生食 500mL | | ● | × | × |
| 投与時間 | 1時間 | | | | |
| 2本目 | 末梢主管点滴注射 生食 500mL | 末梢側管点滴注射 アロキシ(0.75) 0.75mg デカドロン(6.6) 6.6mg デカドロン(1.65) 3.3mg 生食 100mL | ● | × | × |
| 投与時間 | | 30分 | | | |
| 3本目 | | 末梢側管点滴注射 | ● | × | × |
| 投与時間 | | ロゼウス _____ mg 生食 50mL 全開 (_____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ %doseへ減量) | | | |
| 4本目 | | 末梢側管点滴注射 生食 50mL | ● | × | × |
| 投与時間 | 1時間 | 全開 | | | |
| 5本目 | 末梢主管点滴注射 フロセミド注(20) 20mg 生食 50mL | | ● | × | × |
| 投与時間 | 全開 | | | | |
| 6本目 | 末梢主管点滴注射 シスプラチン _____ mg 生食 250mL | | ● | × | × |
| 投与時間 | 2時間 (_____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ %doseへ減量) | | | | |
| 7本目 | 末梢主管点滴注射 硫酸Mg補正液1mEq/mL 4mL L-アスパラギン酸K点滴静注液 10mL 生食 500mL | | ● | × | × |
| 投与時間 | 1時間 | | | | |

| | | | | | |
|------|---|--|---|---|---|
| 1本目 | 末梢主管点滴注射 デカドロン(6.6) 6.6mg 生食 100mL | | × | ● | × |
| 投与時間 | 30分 | | | | |
| 2本目 | 末梢主管点滴注射 ロゼウス _____ mg 生食 50mL | | × | ● | × |
| 投与時間 | 全開 (_____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ %doseへ減量) | | | | |
| 3本目 | 末梢主管点滴注射 生食 250mL | | × | ● | × |
| 投与時間 | 30分 | | | | |

1. その他連絡事項

2017年4月 アスパラカリウム→L-アスパラギン酸K点滴静注液へ変更
 2016年11月 レイアウト変更
 2016年4月 ショートハイドレーションへ変更
 2016年3月 ナベルピン→ロゼウス
 2013年2月 レジメン番号変更
 2010年3月16日作成