				_		59-022
ID	:	身長 :	cm	アブラキサン	ノ(壊死性) 1	00mg/m²
フリガラ	⊢ :	体重:	kg	カルホーフ	プラチン(炎症性) AUC=6
患者氏	<i>₽</i> .	体表面積 :	m [†]			
忠有氏	1 12 :	クレアチニン:	mg/dL			
4	- u		<u> </u>	1		
生年月	日 : M·T·S 年	月 日生まれ		薬剤師1次監査	在	月 日
>/. - 1	m 外来初回治療日	予定コ	一ス数	来州即「久重直		/1 1
治療計		コース目day 開始 評価コ			薬剤師	
	D	ше	PHS	(FI)	2次監査	Ħ
外来担	当医: 「	「IS 記載医師 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	FIIS		2公皿且	
_	+1			1 15		
Rp		g与スケジュール:1コース21日間 ━	day1 day8	day15		
4 + 0	インラインフィルターつきのルート不	<u>n</u>				
1本日	末梢主管点滴注射		• ×	×		
	アロキシ(0.75)	0. 75mg				
	デカドロン(6.6)	6. 6mg				
	生食 100mL					
投与時間		30分				
2本目	末梢主管点滴注射		• ×	×		
	生食 50mL					
投与時間		全開				
3本目	末梢主管点滴注射	_ <i>p</i>	• x	×		
0.1.1						
	アブラキサン	mg				
	生食mL(5m	ng/ml ヘ調制)				
投与時間	/	30分				
	(年月日	_%doseへ減量)				
4本日	末梢主管点滴注射		• ×	×		
	生食 50mL					
投与時間		全開				
5本目	末梢主管点滴注射		• ×	×		
	ナル ギ ーニィン					
	カルボプラチン	mg				
	5%ブドウ糖液 250mL					
投与時間		60分				
3	(年月日	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
6本目	末梢主管点滴注射		• ×	×		
O/TI	生食 50mL		• "			
投与時間	工及 SOIIIL	全開				
投 子 吁 间		土田				
	<i>からかコ</i> ルターつきのリーL エ	<u>ਜ</u>				
1 🛧 🖵	インラインフィルターつきのルート不	PJ				
1 44 1	末梢主管点滴注射	6.6	×			
	デカドロン(6.6)	6. 6mg				
	生食 100mL					
投与時間		30分				
2本目	末梢主管点滴注射		×	•		
	生食 50mL					
投与時間		全開				
3本目	末梢主管点滴注射		×	•		
	アブラキサン	mg				
	生食mL(5m	ng/mLへ調製)				
机片吐即		30分				
投与時間	(年 月 日	30万 %doseへ減量)				
4 🛨 🗁	<u>(年 月 日 </u> 末梢主管点滴注射	70uUSE 、小 似里/				
4本目			×	•		
l. .	生食 50mL	A 88				
投与時間		全開	1	1	l	

1. その他連絡事項