外来化学療法 投与計画書

呼吸器内科 CDDP+ペメトレキセド療法(悪性中皮腫) 【ショートハイドレーション】

59-091

ID	:	身長 :	cm	ペメトレキセト	(炎症性)	500mg/ m i
フリガラ	ナ :	体重 :	kg	シスプ [°] ラ	チン(炎症性)	75mg/ m i
患者氏	名 :	体表面積 :	m¹			
心石以	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	クレアチニン:	mg/dL			
生年月	日 : M·T·S 年	月 日生まれ				
				薬剤師1次監査	年	月日
治療計	-画 外来初回治療日	予定コース数		4	ᅓᄼᆀᄼᄑ	
	ロ 平成 年 月 日よ	リニュース目day 開始 評価コース数	PHS	FP	薬剤師 2次監査	FP
外来担	∃当医:	PHS 記載医師	РПЗ		2次监宜	
Rp			day8	day15		
内服	入室時イメンド125mg 1カプセル		X	X		
1 3/3/2		コプセル朝食後 2日分 day2-3	+	×		
		1日8mg 食後 2日分 day2-3				
1本目	末梢主管点滴注射	•	×	×		
	硫酸Mg補正液1mEq/mL 4mL					
	アスパラカリウム注 10mL					
	生食 500mL					
投与時間						
2本目		末梢側管点滴注射 ●	×	×		
	生食 500mL	アロキシ(0.75) 0.75mg				
		デカドロン(6. 6) 6. 6mg				
		デカドロン(1. 65) 3. 3mg				
+0. ← n+ 88		生食 100mL				
投与時間 3本目	-	20分 2 0分 ★ 末梢側管点滴注射	×	×		
3年日		本 相則官思尚注别	_ ^	^		
		ペメトレキセドmg				
		生食 100mL				
投与時間		10分				
		(年月日%doseへ減量)				
4本目		末梢側管点滴注射 ●	×	×		
		生食 50mL				
投与時間	1時間	全開				
5本目	末梢主管点滴注射		×	×		
	フロセミド注(20) 20mg					
ID ======	生食 50mL					
投与時間	全開 全開 末梢主管点滴注射		×			
6本目	木佣土官从尚注別	•	*	×		
	シスプラチン mg					
	生食 250mL					
投与時間	2時間					
	(年月日%doseへ減量)					
7本目		•	×	×		
	硫酸Mg補正液1mEq/mL 4mL					
	アスパラカリウム注 10mL					
	生食 500mL					
投与時間	1時間					

1. その他連絡事項

^{1.} ての他連般争項 【ペメトレキセドに対するプレメディケーション】 *ビタミンB12 1mg【ex:メチコバール®】の筋注を投与開始少なくとも7日前に投与し、 投与期間中、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与する。 *葉酸0.5mg【ex:パンビタン®】を投与開始7日以上前より連日経口投与し最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。