

# 外来化学療法 投与計画書

# 呼吸器内科 ヘムブロリスマブ+CBDCA+PAC療法

59-153

ID	:	身長	:	cm	キイトルーダ(起炎症性) 200mg/body パクリタキセル(壊死性) 200mg/m <sup>2</sup> カルボプラチン(炎症性) AUC=6				
フリガナ	:	体重	:	kg					
患者氏名	:	体表面積	:	m <sup>2</sup>					
	:	クレアチニン	:	mg/dL					
生年月日	:	S・H・R	年	月	日	生まれ			
治療計画	外来初回治療日	年	月	日	より	コース目day	開始	予定コース数	評価コース数
外来担当医:	PHS	記載医師	PHS	①	薬剤師	2次監査	①		
Rp		投与スケジュール:1コース21日間	day1	day8	day15				
	インラインフィルター(0.2~5μm)つきのルートを使用								
	アプレピタント(125)は入室時に服用								
1本目	末梢主管点滴注射		●	×	×				
	キイトルーダ 200mg								
	生食 100mL								
投与時間	30分								
	(年 月 日 %doseへ減量)								
2本目	末梢主管点滴注射		●	×	×				
	生食 50mL								
投与時間	全開								
3本目	末梢主管点滴注射		●	×	×				
	デカドロン(6.6)	13.2mg							
	ファモチジン(20)	20mg							
	アロキシ(0.75)	0.75mg							
	ポララミン(5)	5mg							
生食	100mL								
投与時間	30分								
4本目	末梢主管点滴注射		●	×	×				
	パクリタキセル _____mg								
	生食 500mL								
投与時間	3時間								
	(年 月 日 %doseへ減量)								
5本目	末梢主管点滴注射		●	×	×				
	カルボプラチン _____mg								
	5%ブドウ糖液 250mL								
投与時間	1時間								
	(年 月 日 %doseへ減量)								
6本目	末梢主管点滴注射		●	×	×				
	生食 50mL								
投与時間	全開								

## 1. その他連絡事項