

外来化学療法
投与計画書

呼吸器外科・呼吸器内科・腫瘍内科
【術前】ペムブロリズマブ+CDDP+ペメトレキセド療法

ID		身長		cm		59-203B	
フリガナ		体重		kg		キイトルーダ 200mg/body	
患者氏名		体表面積		㎡		ペメトレキセド 500mg/㎡	
		クレアチニン		mg/dL		シスプラチン 75mg/㎡	
生年月日						S・H・R 年 月 日生まれ	
治療計画		外来初回治療日		予定コース数		薬剤師1次監査	
		年 月 日より		コース目 day 開始		年 月 日	
		評価コース数					
外来担当医		PHS		記載医師		PHS	
Rp		投与スケジュール: 1コース21日間		day 1		day 8	
				day 15			
内服		入室時アブレピタント125mg 1カプセル服用		●		×	
		day2以降 アブレピタント80mg 1カプセル朝食後 2日分		day2-3		×	
		デカドロン(0.5) 1日8mg 食後 2日分		day2-3		×	
		インラインフィルター(0.2~5μm) 付きのルートを使用		●		×	
1本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		キイトルーダ 200 mg					
		生食 100mL					
投与時間		30分					
		(年 月 日 %doseへ減量)					
2本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		生食 50mL					
投与時間		全開					
3本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		硫酸Mg補正液1mEq/mL 4mL					
		L-アスパラギン酸K点滴静注液 10mL					
		生食 500mL					
投与時間		1時間					
4本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		生食 500mL					
		末梢側管点滴注射					
		パロノセトロン(0.75) 0.75mg					
		デカドロン(6.6) 6.6mg					
		デカドロン(1.65) 3.3mg					
		生食 100mL					
投与時間		20分					
5本目		末梢側管点滴注射		●		×	
		ペメトレキセド mg					
		生食 100mL					
投与時間		10分					
		(年 月 日 %doseへ減量)					
6本目		末梢側管点滴注射		●		×	
		生食 50mL					
投与時間		1時間					
		全開					
7本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		フロセミド注(20) 20mg					
		生食 50mL					
投与時間		全開					
8本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		シスプラチン mg					
		生食 250mL					
投与時間		2時間					
		(年 月 日 %doseへ減量)					
9本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		硫酸Mg補正液1mEq/mL 4mL					
		L-アスパラギン酸K点滴静注液 10mL					
		生食 500mL					
投与時間		1時間					

1. その他連絡事項
【ペメトレキセドに対するプレメディケーション】
*ビタミンB12 1mg【ex:メチコパール®】の筋注を投与開始少なくとも7日前に投与し、
投与期間中、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与する。
*葉酸0.5mg【ex:バンピタン®】を投与開始7日以上前より連日経口投与し最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。

薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報提供)
☒ 依頼する ☐ 依頼しない