

外来化学療法
投与計画書

呼吸器内科・呼吸器外科・腫瘍内科
【術前】ペムブロリズマブ+CBDCA+ペトレキシド療法

59-204B

キイトルーダ 200mg/body
ペトレキシド 500mg/m²
カルボプラチン AUC=5

ID	:	身長	:	cm
フリガナ	:	体重	:	kg
患者氏名	:	体表面積	:	m ²
		クレアチニン	:	mg/dL
生年月日 : S・H・R 年 月 日生まれ				
治療計画		外来初回治療日 年 月 日より コース目 day 開始		予定コース数 評価コース数
外来担当医:		PHS	記載医師	PHS
				⑩
				薬剤師 2次監査 ⑩
Rp		投与スケジュール: 1コース21日間		
		day1	day8	day15
	インラインフィルター(0.2~5μm)つきのルートを使用	●	×	×
1本目	末梢主管点滴注射 キイトルーダ 200 mg 生食 100mL 30分 (年 月 日 %doseへ減量)	●	×	×
2本目	末梢主管点滴注射 生食 50mL 全開	●	×	×
3本目	末梢主管点滴注射 パロノセトロン(0.75) デカドロン(6.6) 生食 100mL 20分	●	×	×
4本目	末梢主管点滴注射 ペトレキシド mg 生食 100mL 10分 (年 月 日 %doseへ減量)	●	×	×
5本目	末梢主管点滴注射 生食 100mL 30分	●	×	×
6本目	末梢主管点滴注射 カルボプラチン mg 5%ブドウ糖液 250mL 60分 (年 月 日 %doseへ減量)	●	×	×
7本目	末梢主管点滴注射 生食 50mL 全開	●	×	×

1. その他連絡事項
【ペトレキシドに対するプレメディケーション】
*ビタミンB12 1mg【ex:メチコパール®】の筋注を投与開始少なくとも7日前に投与し、
投与期間中、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与する。
*葉酸0.5mg【ex:パンビタン®】を投与開始7日以上前より連日経口投与し最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。
薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報提供)
☒ 依頼する ☐ 依頼しない

外来化学療法
投与計画書

呼吸器内科・呼吸器外科・腫瘍内科
【術前】ペムブロリズマブ+CBDCA+ペメトレキセド療法