

外来化学療法
投与計画書

呼吸器内科、呼吸器外科、腫瘍内科
オシメルチニブ+CBDCA+ペメトレキセド療法

59-215

ID	:	身長	:	cm
フリガナ	:	体重	:	kg
患者氏名	:	体表面積	:	m ²
		クレアチニン	:	mg/dL

タグリッソ 80mg/body
ペメトレキセド 500mg/m²
カルボプラチン AUC=5

生年月日		: S・H・R		年	月	日	生まれ					
治療計画	外来初回治療日		年		月	日	より	コース目	day	開始	予定コース数	評価コース数
外来担当医:		PHS		記載医師		PHS		⑩		薬剤師 2次監査		⑩
Rp			投与スケジュール: 1コース21日間		day1	day8	day15					
	アプレピタント併用											
1本目	末梢主管点滴注射				●	×	×					
	パロノセトロン(0.75)		0.75mg									
	デカドロン(6.6)		6.6mg									
	生食 100mL											
投与時間			20分									
2本目	末梢主管点滴注射				●	×	×					
	ペメトレキセド		_____mg									
	生食 100mL											
投与時間			10分									
	(_____年_____月_____日_____ %doseへ減量)											
3本目	末梢主管点滴注射				●	×	×					
	生食 100mL											
投与時間			全開									
4本目	末梢主管点滴注射				●	×	×					
	カルボプラチン		_____mg									
	5%ブドウ糖液 250mL											
投与時間			60分									
	(_____年_____月_____日_____ %doseへ減量)											
5本目	末梢主管点滴注射				●	×	×					
	生食 50mL											
投与時間			全開									
内服処方	タグリッソ 80mg				21日間服用							
	1日1回服用											

1. その他連絡事項
【ペメトレキセドに対するプレメディケーション】
*ビタミンB12 1mg【ex:メチコパール®】の筋注を投与開始少なくとも7日前に投与し、
投与期間中、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与する。
*葉酸0.5mg【ex:パンビタン®】を投与開始7日以上前より連日経口投与し最終投与日から22日目まで可能な限り投与
薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報提供)
☒ 依頼する ☐ 依頼しない