

外来化学療法
投与計画書

呼吸器内科
【80kg未満】アミバンタマブ+CBDCA+PEM療法【1コース目】

※2枚目あります

ID		身長		cm		59-219A	
フリガナ		体重		kg		ライブリバント(Day1) 350mg/body	
患者氏名		体表面積		㎡		ライブリバント(Day2) 1050mg/body	
		クレアチニン		mg/dL		ライブリバント(Day8, 15) 1400mg/body	
						ペメトレキセド 500mg/㎡	
生年月日		S・H・R		年 月 日生まれ		カルボプラチン AUC=5 (Max:750mg)	
治療計画		外来初回治療日		予定コース数		薬剤師1次監査	
		年 月 日より		コース目 day 開始		年 月 日	
外来担当医		PHS		記載医師		PHS	
Rp		投与スケジュール: 1コース21日間		day1		day2	
				day8		day15	
1本目		インラインフィルターのついたルートを使用		●		×	
		末梢主管点滴注射		×		×	
		デカドロン(6. 6)		19. 8mg			
		パロノセトロン(0. 75)		0. 75mg			
		生食 100mL					
投与時間		20分					
2本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		ペメトレキセド _____mg		×		×	
		生食 100mL					
投与時間		10分					
		(_____年 _____月 _____日 _____%doseへ減量)					
3本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		生食 50mL		×		×	
投与時間		全開					
4本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		カルボプラチン _____mg		×		×	
		5%ブドウ糖液 250mL					
投与時間		1時間					
		(_____年 _____月 _____日 _____%doseへ減量)					
5本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		生食 50mL		×		×	
投与時間		全開					
6本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		ファモチジン(20)		20mg		×	
		ボララミン(5)		5mg		×	
		生食 100mL					
投与時間		15分					
7本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		アセリオ(100ml)		1000mg		×	
投与時間		15分					
8本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		生食ヒカリ 500mL		×		×	
		末梢側管点滴注射					
		ライブリバント_350_mg					
		生食全量 250mL					
		開始後50mL/h					
		2時間後75mL/h					
投与時間		(_____年 _____月 _____日 _____%doseへ減量)					
9本目		末梢側管点滴注射		●		×	
		生食 50mL		×		×	
投与時間		全開					

1本目		インラインフィルターのついたルートを使用		×		●	
		末梢主管点滴注射		×		×	
		デカドロン(6. 6)		6. 6mg			
		デカドロン(1. 65)		3. 3mg			
		ファモチジン(20)		20mg			
		ボララミン(5)		5mg			
		生食 100mL					
投与時間		15分					
2本目		末梢主管点滴注射		×		●	
		アセリオ(100ml)		1000mg		×	
投与時間		15分					
3本目		末梢主管点滴注射		×		●	
		生食ヒカリ 500mL		×		×	
		末梢側管点滴注射					
		ライブリバント_1050_mg					
		生食全量 250mL					
		開始後33mL/h					
		2時間後50mL/h					
投与時間		(_____年 _____月 _____日 _____%doseへ減量)					
4本目		末梢側管点滴注射		×		●	
		生食 50mL		×		×	
投与時間		全開					

1. その他連絡事項
薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報提供)

外来化学療法 投与計画書

呼吸器内科
【80kg未満】アミバンタマブ+CBDCA+PEM療法【1コース目】

- ☒ 依頼する ☐ 依頼しない
- ・コース終了後59-219Bへ移行
 - ・アセリオについて体重が50kg未満は15mg/kgに減量

外来化学療法
投与計画書

呼吸器内科
【80kg未満】アミバンタマブ+CBDCA+PEM療法【1コース目】

ID : 身長 : cm

フリガナ : 体重 : kg

患者氏名 : 体表面積 : m²

クレアチニン : mg/dL

59-220A
ライブリバント(Day1) 350mg/body
ライブリバント(Day2) 1050mg/body
ライブリバント(Day8, 15) 1400mg/body
ラズクルーズ 240mg/body

生年月日 : S・H・R 年 月 日生まれ

治療計画
外来初回治療日
年 月 日より コース目 day 開始
予定コース数
評価コース数

外来担当医 : PHS 記載医師 : PHS

Rp
投与スケジュール: 1コース21日間
day1 day2 day8 day15

⑤ 薬剤師 2次監査 ⑤

年 月 日

1本目	末梢主管点滴注射 デカドロン(6. 6) 6. 6mg デカドロン(1. 65) 3. 3mg ファモチジン(20) 20mg ポララミン(5) 5mg 生食 100mL 投与時間 15分		×	×	●	×
2本目	末梢主管点滴注射 アセリオ(100ml) 1000mg 投与時間 15分		×	×	●	×
3本目	末梢主管点滴注射 生食ヒカリ 500mL 12. 5時間(40mL/hr) ライブリバント 投与終了後残破棄	末梢側管点滴注射 ライブリバント__1400__mg 生食全量 250mL 65mL/h (年 月 日 %doseへ減量)	×	×	●	×
4本目		末梢側管点滴注射 生食 50mL 全開	×	×	●	×

1本目	末梢主管点滴注射 デカドロン(6. 6) 6. 6mg デカドロン(1. 65) 3. 3mg ファモチジン(20) 20mg ポララミン(5) 5mg 生食 100mL 投与時間 15分		×	×	×	●
2本目	末梢主管点滴注射 アセリオ(100ml) 1000mg 投与時間 15分		×	×	×	●
3本目	末梢主管点滴注射 生食ヒカリ 500mL 12. 5時間(40mL/hr) ライブリバント 投与終了後残破棄	末梢側管点滴注射 ライブリバント__1400__mg 生食全量 250mL 85mL/h (年 月 日 %doseへ減量)	×	×	×	●
4本目		末梢側管点滴注射 生食 50mL 全開	×	×	×	●

1. その他連絡事項
薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報提供)
☒ 依頼する ☐ 依頼しない
- ・コース終了後59-219Bへ移行
・アセリオについて体重が50kg未満は15mg/kgに減量