

外来化学療法
投与計画書

呼吸器内科
【80kg以上】アミバンタマブ+CBDCA+PEM療法【1コース目】

※2枚目あります

ID		身長		cm		59-219E	
フリガナ		体重		kg		ライブリバント(Day1) 350mg/body	
患者氏名		体表面積		㎡		ライブリバント(Day2) 1400mg/body	
		クレアチニン		mg/dL		ライブリバント(Day8, 15) 1750mg/body	
						ペムトレキセド 500mg/㎡	
生年月日		S・H・R		年 月 日生まれ		カルボプラチン AUC=5 (Max:750mg)	
治療計画		外来初回治療日		コース目 day 開始		薬剤師1次監査	
				予定コース数		年 月 日	
				評価コース数			
外来担当医		PHS		記載医師		PHS	
Rp		投与スケジュール: 1コース21日間		day1		day2	
				day8		day15	
1本目		インラインフィルターのついたルートを使用		●		×	
		末梢主管点滴注射		×		×	
		デカドロン(6. 6)		19. 8mg		×	
		パロノセトロン(0. 75)		0. 75mg		×	
		生食 100mL					
投与時間		20分					
2本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		ペムトレキセド _____mg		×		×	
		生食 100mL					
投与時間		10分					
		(_____年 _____月 _____日 _____%doseへ減量)					
3本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		生食 50mL		×		×	
投与時間		全開					
4本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		カルボプラチン _____mg		×		×	
		5%ブドウ糖液 250mL					
投与時間		1時間					
		(_____年 _____月 _____日 _____%doseへ減量)					
5本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		生食 50mL		×		×	
投与時間		全開					
6本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		ファモチジン(20)		20mg		×	
		ポララミン(5)		5mg		×	
		生食 100mL					
投与時間		15分					
7本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		アセリオ(100ml)		1000mg		×	
投与時間		15分					
8本目		末梢主管点滴注射		●		×	
		生食ヒカリ 500mL		×		×	
		12. 5時間(40mL/hr)					
投与時間		ライブリバント 投与終了後残破棄					
9本目		末梢側管点滴注射		●		×	
		生食 50mL		×		×	
投与時間		全開					

1本目		インラインフィルターのついたルートを使用		×		●	
		末梢主管点滴注射		×		×	
		デカドロン(6. 6)		6. 6mg			
		デカドロン(1. 65)		3. 3mg			
		ファモチジン(20)		20mg			
		ポララミン(5)		5mg			
		生食 100mL					
投与時間		15分					
2本目		末梢主管点滴注射		×		●	
		アセリオ(100ml)		1000mg		×	
投与時間		15分					
3本目		末梢主管点滴注射		×		●	
		生食ヒカリ 500mL		×		×	
		12. 5時間(40mL/hr)					
投与時間		ライブリバント 投与終了後残破棄					
4本目		末梢側管点滴注射		×		●	
		生食 50mL		×		×	
投与時間		全開					

1. その他連絡事項
薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報提供)

外来化学療法 投与計画書

呼吸器内科
【80kg以上】アミバンタマブ+CBDCA+PEM療法【1コース目】

- ☒ 依頼する ☐ 依頼しない
- ・コース終了後59-219Fへ移行
 - ・アセリオについて体重が50kg未満は15mg/kgに減量

外来化学療法
投与計画書

呼吸器内科
【80kg以上】アミバンタマブ+CBDCA+PEM療法【1コース目】

ID		身長		cm		59-220E			
フリガナ		体重		kg		ライブリバント(Day1) 350mg/body			
患者氏名		体表面積		㎡		ライブリバント(Day2) 1400mg/body			
		クレアチニン		mg/dL		ライブリバント(Day8, 15) 1750mg/body ベメトレキセド 500mg/㎡			
生年月日						S・H・R 年 月 日生まれ		カルボプラチン AUC=5 (Max:750mg)	
治療計画		外来初回治療日		コース目 day		開始		予定コース数	
外来担当医		PHS		記載医師		PHS		薬剤師 2次監査	
Rp		投与スケジュール: 1コース21日間		day1		day2		day8	
day15									
1本目		末梢主管点滴注射		×		×		●	
デカドロン(6. 6)		6. 6mg							
デカドロン(1. 65)		3. 3mg							
ファモチジン(20)		20mg							
ポララミン(5)		5mg							
生食 100mL		15分							
2本目		末梢主管点滴注射		×		×		●	
アセリオ(100ml)		1000mg							
3本目		末梢主管点滴注射		×		×		●	
生食ヒカリ 500mL		12. 5時間(40mL/hr)							
ライブリバント		ライブリバント__1750__mg							
投与終了後残破棄		生食全量 250mL							
4本目		末梢側管点滴注射		×		×		●	
生食 50mL		全開							

1本目		末梢主管点滴注射		×		×		×	
デカドロン(6. 6)		6. 6mg							
デカドロン(1. 65)		3. 3mg							
ファモチジン(20)		20mg							
ポララミン(5)		5mg							
生食 100mL		15分							
2本目		末梢主管点滴注射		×		×		×	
アセリオ(100ml)		1000mg							
3本目		末梢主管点滴注射		×		×		×	
生食ヒカリ 500mL		12. 5時間(40mL/hr)							
ライブリバント		ライブリバント__1750__mg							
投与終了後残破棄		生食全量 250mL							
4本目		末梢側管点滴注射		×		×		×	
生食 50mL		全開							

1. その他連絡事項
- 薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報提供)
- ☒ 依頼する ☐ 依頼しない
- ・コース終了後59-219Fへ移行
- ・アセリオについて体重が50kg未満は15mg/kgに減量