

外来化学療法
投与計画書

呼吸器内科・外科・腫瘍内科
アミバンタマブ+CBDCA+PEM【2コース目】療法【80kg以上】

ID		身長		cm		59-219F	
フリガナ		体重		kg		ライブリバント 1750mg/body	
患者氏名		体表面積		㎡		ペメトレキセド 500mg/㎡	
		クレアチニン		mg/dL		カルボプラチン AUC=5 (Max:750mg)	
生年月日						S・H・R 年 月 日生まれ	
治療計画		外来初回治療日		予定コース数		薬剤師1次監査	
		年 月 日より		コース目day 開始		年 月 日	
外来担当医:		PHS		記載医師		PHS	
Rp		投与スケジュール:1コース21日間		day1		day8	
				day15			
1本目		インラインフィルター0.2μm以下のついたルートを使用		●		×	
末梢主管点滴注射				●		×	
デカドロン(6.6)		6.6mg					
デカドロン(1.65)		3.3mg					
パロノセトロン(0.75)		0.75mg					
生食 100mL							
投与時間		20分					
2本目		末梢主管点滴注射		●		×	
ペメトレキセド		mg					
生食 100mL							
投与時間		10分					
(年 月 日 %doseへ減量)							
3本目		末梢主管点滴注射		●		×	
生食 50mL							
投与時間		全開					
4本目		末梢主管点滴注射		●		×	
カルボプラチン		mg					
5%ブドウ糖液 250mL							
投与時間		60分					
(年 月 日 %doseへ減量)							
5本目		末梢主管点滴注射		●		×	
生食 50mL							
投与時間		全開					
6本目		末梢主管点滴注射		●		×	
ファモチジン(20)		20mg					
ポララミン(5)		5mg					
生食 100mL							
投与時間		15分					
7本目		末梢主管点滴注射		●		×	
アセリオ静注用バッグ(100mL)		1000mg					
投与時間		15分					
8本目		末梢主管点滴注射		●		×	
生食 50mL							
投与時間		全開					
9本目		末梢主管点滴注射		●		×	
ライブリバント		1750mg					
生食全量 250mL							
投与時間		125 mL/h					
(年 月 日 %doseへ減量)							
10本目		末梢主管点滴注射		●		×	
生食 50mL							
投与時間		全開					

1. その他連絡事項
薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報提供)

外来化学療法 投与計画書

☒ 依頼する

・コース終了後59-217Gへ移行

・アセリオについて体重が50kg未満は15mg/kgに減量

呼吸器内科・外科・腫瘍内科

アミバンタマブ+CBDCA+PEM【2コース目】療法【80kg以上】

☐ 依頼しない