

外来化学療法
投与計画書

ペムブロリスマブ+CDDP+ペメトレキセド療法(胸膜中皮腫)【ショートハイドレーション】

呼吸器内科

ID :	身長 :	cm
フリガナ :	体重 :	kg
患者氏名 :	体表面積 :	m ²
	クレアチニン :	mg/dL

59-095

キイトルーダ 200mg/body
ペメトレキセド 500mg/m²
シスプラチン 75mg/m²

生年月日 : S・H・R 年 月 日生まれ

薬剤師1次監査	年 月 日	
	(印)	薬剤師 (印) 2次監査

Rp	投与スケジュール: 1コース21日間	day1	day8	day15	
内服	入室時アプレビタント125mg 1カプセル服用	●	×	×	
	day2以降 アプレビタント80mg 1CP 2日分 デカドロン 1日8mg 2日分	day2-3 day2-3	×	×	
	インラインフィルター(0.2~5 μm)つきのルートを使用				
1本目	末梢主管点滴注射 キイトルーダ 200mg 生食 100mL	●	×	×	
投与時間	30分 (年 月 日 %doseへ減量)				
2本目	末梢主管点滴注射 生食 50mL	●	×	×	
投与時間	全開				
3本目	末梢主管点滴注射 硫酸Mg補正液1mEq/mL 4mL L-アスパラギン酸K点滴静注液 10mL 生食 500mL	●	×	×	
投与時間	1時間				
4本目	末梢主管点滴注射 生食 500mL	末梢側管点滴注射 パロノセトロン(0.75) 0.75mg デカドロン(6.6) 6.6mg デカドロン(1.65) 3.3mg 生食 100mL	●	×	×
投与時間		20分			
5本目		末梢側管点滴注射 ペメトレキセド mg 生食 100mL	●	×	×
投与時間		10分 (年 月 日 %doseへ減量)			
6本目		末梢側管点滴注射 生食 50mL	●	×	×
投与時間	1時間	全開			
7本目	末梢主管点滴注射 フロセミド注(20) 20mg 生食 50mL		●	×	×
投与時間	全開				
8本目	末梢主管点滴注射 シスプラチン mg 生食 250mL		●	×	×
投与時間	2時間 (年 月 日 %doseへ減量)				
9本目	末梢主管点滴注射 硫酸Mg補正液1mEq/mL 4mL L-アスパラギン酸K点滴静注液 10mL 生食 500mL		●	×	×
投与時間	1時間				

1. その他連絡事項

薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報提供)
 依頼する 依頼しない

【ペメトレキセドに対するプレメディケーション】

*ビタミンB12 1mg【ex:メチコバール®】の筋注を投与開始少なくとも7日前に投与し、

投与期間中、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与する。

*葉酸0.5mg【ex:パンビタン®】を投与開始7日前より連日経口投与し最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。

