

外来化学療法 投与計画書

呼吸器内科

ヘムブロリスマブ+CBDCA+ペメトレキセド療法(胸膜中皮腫)

59-096

キイトルーダ 200mg/body

ペメトレキセド 500mg/m²

カルボプラチナ AUC=6

ID :	身長 :	cm
フリガナ :	体重 :	kg
患者氏名 :	体表面積 :	m ²
	クレアチニン :	mg/dL

生年月日 : S・H・R 年 月 日生まれ

治療計画	外来初回治療日 年 月 日より	コース目day	予定コース数		薬剤師 1次監査 印	年 月 日	薬剤師 2次監査 印
			開始	評価コース数			
外来担当医:		PHS	記載医師	PHS			
Rp		投与スケジュール: 1コース21日間	day1	day8	day15		
内服	入室時アプレピタント125mg 1カプセル服用		●	×	×		
	day2以降 アプレピタント80mg 1CP 2日分		day2-3	×	×		
	インラインフィルター(0.2~5 μm)つきのルートを使用						
1本目	末梢主管点滴注射 キイトルーダ 200mg 生食 100mL	30分 (年 月 日 %doseへ減量)	●	×	×		
投与時間							
2本目	末梢主管点滴注射 生食 50mL	全開	●	×	×		
投与時間							
3本目	末梢主管点滴注射 パロノセトロン(0.75) デカドロン(6.6) 生食 100mL	0.75mg 6.6mg 20分	●	×	×		
投与時間							
4本目	末梢主管点滴注射 ペメトレキセド _____ mg 生食 100mL	10分 (年 月 日 %doseへ減量)	●	×	×		
投与時間							
5本目	末梢主管点滴注射 生食 100mL	30分	●	×	×		
投与時間							
6本目	末梢主管点滴注射 カルボプラチナ _____ mg 5%ブドウ糖液 250mL	60分 (年 月 日 %doseへ減量)	●	×	×		
投与時間							
7本目	末梢主管点滴注射 生食 50mL	全開	●	×	×		
投与時間							

1. その他連絡事項

薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報提供)

依頼する 依頼しない

【ペメトレキセドに対するプレメディケーション】

*ビタミンB12 1mg【ex:メチコバール®】の筋注を投与開始少なくとも7日前に投与し、
投与期間中、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与する。

*葉酸0.5mg【ex:パンビタン®】を投与開始7日以上前より連日経口投与し最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。
薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報提供)

外来化学療法
投与計画書

依頼する

呼吸器内科

ヘムブロリスマブ+CBDCA+ヘメトレキセト療法(胸膜中皮腫)

依頼しない